

### کارت اطلاعات بییهوشی عمومی برای بخش سزارین

- بییهوشی عمومی اغلب برای عمل سزارین اورژانسی مورد نیاز است، زیرا زمان کافی برای بییهوشی نخاعی یا اپیدورال وجود ندارد.
- سرنگ ماسوره درون وریدی در دست یا بازوی شما فرو خواهد رفت.
- خطر بییهوشی عمومی این است که اسید معده شما ممکن است موقع خواب وارد شش های شما شود. برای کاهش این خطر داروی ضد اسید با یک شیار آبچکان به شما تزریق می شود یا به پای شما سوزن می زنند یا داروی مایع آن را می دهند تا بنوشید.
- در اتاق عمل نیز ماسکی بر صورت شما قرار می گیرد تا بتوانید از طریق آن اکسیژن را تنفس کنید. ممکن است ماسک کمی چفت و سفت باشد، اما برای رساندن اکسیژن به شما حیاتی است.
- داروی بییهوشی عمومی را وارد سرنگ شما خواهد شد. وقتی به خواب بروید، ممکن است در ناحیه گردن احساس فشار داشته باشید. این امر بخاطر محافظت از شش ها و مسیر هوایی تنفس شماست.
- همراه تولد نوزاد شما اجازه ندارد در اتاق عمل شما را همراهی کند، اما می تواند در همان نزدیکی ها باشد.
- شما در اتاق هوش آوری (بهبودی) بیدار خواهید شد و می توانید به محض بیدار شدن نوزاد خود را ببینید.
- وقتی بیدار شوید، ممکن است کمی گلودرد داشته باشید و احساس بیماری داشته باشید. در صورت نیاز مسکن ها و داروهای ضدتهوع در اختیارتان قرار خواهد گرفت.
- هر سال در انگلستان، 17000 جراحی با بییهوشی عمومی در بخش سزارین صورت می گیرد و مشکلات بسیار کمی وجود دارد. با این حال، باید مراقب خطرات و اثرات جانبی بییهوشی عمومی بود. این خطرات در طرف دیگر این کارت توضیح داده شده است.

| خطرات و اثرات جانبی بیهوشی عمومی  |  |
|---|--|
| مشکل احتمالی  | میزان رایج بودن مشکل   |
| لرزه  | رایج- تقریباً 1 در 3 نفر   |
| گلو درد   | رایج- تقریباً 1 در 2 نفر   |
| حس کسالت و بیماری   | رایج- تقریباً 1 در 10 نفر  |
| درد ماهیچه  | رایج- تقریباً 1 در 3 نفر   |
| بریدگی یا کبودشدگی لب ها و زبان   | گهگاهی- تقریباً 1 در 20 نفر  |
| آسیب به دندان ها  | تقریباً نادر- تقریباً 1 در 4500 نفر  |
| عدم موفقیت متخصص بیهوشی در گذاشتن لوله تنفس (موقعی که بیهوش هستیید)<br>عفونت قفسه سینه<br>ورود اسید معده به شش ها | نارایج- تقریباً 1 در 250 نفر<br>رایج- تقریباً 1 در 10 نفر اما اکثر عفونت ها شدید نیستند.<br>تقریباً نادر- تقریباً 1 در 1000 نفر      |
| هوشیار بودن در طول عمل جراحی  | نارایج- تقریباً 1 در 400 نفر   |
| واکنش شدید آلرژیک   | نادر- تقریباً 1 در 10,000 نفر  |
| مرگ یا آسیب مغزی  | مرگ:<br>بسیار نادر- تقریباً 1 در 100,000 نفر (1 یا 2 نفر در سال در کل انگلستان)<br>آسیب مغزی:<br>بسیار نادر- اطلاعات دقیق موجود نیست |

اطلاعات دقیق برای تمام خطرات و اثرات جانبی در دسترس نیست. نمودارها تخمینی هستند و ممکن است در بیمارستان های متفاوت فرق داشته باشند. در صورتی که سؤالی دارید با متخصص بیهوشی خود مشورت کنید.



شما می توانید با دانلود بروشور «بیهوشی بخش سزارین» از وبسایت رویال کالج متخصص بیهوشی به نشانی [www.rcoa.ac.uk](http://www.rcoa.ac.uk) اطلاعات بیشتری به دست بیاورید.