

التخدير الناحي بالعمليات القيصرية- بطاقة معلومات

يعد التخدير الناحي (سواء التخدير القطني أو التخدير النخاعي) نوعاً من أنواع حقن تخفيف الألم حيث تعطى المريضة حقنة موضعية أسفل الظهر لتخدير المنطقة من الصدر إلى أسفل. تتخذ الأرجل ولا تستطيع المريضة تحريكهما. يحتاج المخدر من 10 إلى 20 دقيقة ليبدأ مفعوله كاملاً.

التجهيز للمخدر:

- بجهاز تستيل ملحق بإبرة يسمى قنية ويريدية توضع باليد أو الذراع.
- يحقن طبيب التخدير أسفل الظهر بالمخدر الموضعي.
- يركب جهاز قسطرة لتفريغ المثانة.
- يفحص كلاً من ضغط الدم ونسبة الأوكسجين بصورة دورية.

تسمح بعض المستشفيات بوجود الزوج خلال العملية ولكن البعض الآخر يسمح بدخوله في وقت لاحق.

فوائد التخدير الناحي

يعد في أغلب الأحوال أسرع حل عند الحاجة للولادة القيصرية. يتيح للألم أن تكون متيقظة عند ولادة الطفل وغالباً ما يكون مفعول مسكن الألم بعد العملية أفضل عنه في حالات التخدير العام.

المشاكل التي قد تصاحب التخدير الناحي

يجب أن يتأكد طبيب التخدير من تخدر الجسم قبل بدء العملية. تلك الفحوصات ليست سليمة 100% وقد تشعرين ببعض عدم الراحة أثناء العملية من الشائع الشعور بالشد والجذب داخل البطن ويجب ألا تجزي. قد تشعرين في بعض الأحيان بالألم بسيط يمكن السيطرة عليه ببعض مسكنات الألم تحقن بالتستيل أو من خلال قناع أو فمويًا. قد تشعرين بالألم شديد على فترات وعندها يقوم طبيب التخدير بإعطائك مخدر عام وستنامين على الفور.

المخاطر والأعراض الجانبية للمخدر الناحي	
نسبة الشروع	المشاكل المحتملة
شائعة بين من 1-3 أشخاص من كل 10 أشخاص حسب نوع الدواء والجرعة	الحكة
النخاعي: شائع- بين 1 من كل 5 أشخاص	انخفاض شديد بضغط الدم
القطني: عرضي- بين 1 من كل 50 شخص	
شائع – حوالي 1 من بين 8 إلى 10 أشخاص	عدم فاعلية التخدير القطني لدرجة الحاجة لاستخدام مخدر آخر أثناء الولادة القيصرية

<p>النخاعي:</p> <p>عرضي- حوالي 1 من كل 20 شخص</p> <p>القطني:</p> <p>شائع- حوالي 1 من كل 7 أشخاص</p> <p>النخاعي:</p> <p>عرضي- حوالي 1 من كل 50 شخص</p> <p>القطني:</p> <p>عرضي- حوالي 1 من كل 20 شخص.</p>	<p>المخدر غير فعال وتحتاج المريضة إلى مزيد من العقاقير للمساعدة بتخفيف الألم خلال العملية</p> <p>عدم فاعلية المخدر الناحي وتقتضي الحالة استخدام المخدر العام</p>
<p>القطني:</p> <p>غير شائع- حوالي 1 من كل 100 شخص</p> <p>النخاعي:</p> <p>غير شائع- حوالي 1 من كل 500 شخص</p>	<p>صداع حاد</p>
<p>استمرار الإحساس لأقل من ستة أشهر:</p> <p>نادر - حوالي 1 من كل ألف إلى ألفين شخص استمرار الإحساس لأكثر من ستة أشهر:</p> <p>نادر جدًا- حوالي 1 من كل 24000 شخص.</p>	<p>تدمر الأعصاب (على سبيل المثال: تخدر منطقة من الساق أو القدم، ضعف بالساق)</p>
<p>نادر جدا- حوالي 1 من كل 100000 شخص</p>	<p>التهاب السحايا</p>
<p>نادر جدًا- حوالي 1 من كل 50000 شخص</p> <p>نادر جدًا- حوالي 1 من كل 168000 شخص</p> <p>نادر جدًا- حوالي 1 من كل 100000 شخص</p>	<p>خراج (التهاب بموضع الحقن)</p> <p>تجلط الدم بموضع الحقن</p> <p>خراج أو تجلط للدم ينتج عنه إصابة بالغة تؤدي إلى الشلل</p>
<p>نادر جدًا- حوالي 1 من 100000 شخص</p> <p>نادر- حوالي 1 من كل 2000 شخص</p>	<p>لحالات التخدير القطني:</p> <p>حقن وريد بالعمود الفقري بكمية كبيرة من المخدر عن طريق الخطأ</p> <p>حقن كمية كبيرة من المخدر الموضعي إلى السائل النخاعي مما يسبب صعوبة بالتنفس وقد يؤدي في بعض الحالات النادرة إلى فقدان الوعي</p>

لا تتوفر أرقام دقيقة لجميع المخاطر والأعراض الجانبية. الأرقام المذكورة أرقام تقديرية وقد تختلف من مستشفى إلى آخر.

وإذا كانت لديك أي تساؤلات ناقشي الأمر مع طبيب التخدير
www.labourpains.com الكارت ملخص ولمزيد من المعلومات يرجى مراجعة موقع

نحن نشكر مترجمين بلا حدود على تقديم الترجمة للمنظمة

