

എപിഡ്യൂറൽ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കാർഡ്

പ്രസവത്തിൽ എപിഡ്യൂറൽ - താങ്കൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്

(ഈ കാർഡ് ഒരു സംഗ്രഹം മാത്രമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ www.oaaformothers.info നിന്നും ലഭ്യമാണ്. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാത്ത പക്ഷം അ നസ് തറ്റിസ്സുമായി സംസാരിക്കേണ്ടതാണ്)

എപിഡ്യൂറൽ നൽകുന്ന വിധം

- താങ്കൾക്ക് കാനുലയും ചില സാഹചര്യത്തിൽ ഡ്രിപ്പും ആവശ്യമായി വരും.
- എപിഡ്യൂറൽ നൽകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിശ്ചലമായി ഇരിക്കേണ്ടത് വളരെ പ്രധാനമാണ്, കൂടാതെ കൺട്രാക്ഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വേദന അ നസ് തറ്റിസ്സിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.
- സാധാരണഗതിയിൽ എപിഡ്യൂറൽ നൽകുന്നതിനായി 20 മിനിറ്റും കൂടാതെ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിനായി 20 മിനിറ്റും ആവശ്യമാണ്.
- ചില എപിഡ്യൂറൽ പൂർണ്ണമായി പ്രവർത്തിക്കാതെയിരിക്കും, അപ്പോൾ അത് ക്രമീകരിക്കുകയോ അഥവാ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയോ വേണ്ടതായി വരും.

എപിഡ്യൂറൽ കൊണ്ടുള്ള പ്രയോജനങ്ങൾ

- സാധാരണഗതിയിൽ വേദനയ്ക്ക് മികച്ച ആശ്വാസം ലഭിക്കുന്നതാണ്.
- ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ വേദനയിൽ ഫലം ലഭിക്കുന്നതിനായി ആദ്യം സ്പൈനൽ നൽകാറുണ്ട്.
- ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്കിന്റെ രീതിയും, അളവും താങ്കൾക്ക് കട്ടിലിന് ചുറ്റും നടക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭേദപ്പെടുതാവുന്നതാണ്. ഇത് താണമാത്രയിലുള്ള എപിഡ്യൂറൽ ആണ്.
- സിസേറിയൻ വേണ്ടിവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിന്റെ അളവ് ഉയർത്താവുന്നതാണ്.

എപിഡ്യൂറൽ മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ

- ശക്തിയേറിയ ലോക്കൽ അനസ്തെറ്റിക്ക് ആവർത്തിച്ച് നൽകേണ്ടിവരുന്നതു മൂലം കാലുകൾക്ക് താത്കാലിക തളർച്ചയും കൂടാതെ ഫോർസെപ്പ്സ്, ഉപയോഗിച്ചുള്ള പ്രസവത്തിനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- എപിഡ്യൂറൽ പ്രസവത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ടം മന്ദഗതിയിൽ ആക്കാവുന്നതാണ്
- എപിഡ്യൂറൽ കാലയളവിൽ താങ്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ രക്തസമർദ്ദം, ഛൊറിച്ചിൽ, പനി എന്നിവ ഉണ്ടാകാവുന്നതാണ്.
- എപിഡ്യൂറൽ നൽകിയ ഇടം മൂർദ്ധവായിരിക്കും എന്നാൽ ഇത് കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും. നടുവേദന എപിഡ്യൂറൽ മൂലം ഉണ്ടാകുന്നതല്ല, എന്നാൽ പ്രസവത്തിനുശേഷം ഇത് സ്വാഭാവികമാണ്.

ഈ കാർഡിന്റെ മറുവശം എപിഡ്യൂറൽ മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ വിവരിക്കുന്നതാണ്



എപിഡ്യൂറൽ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ കാർഡ്

പ്രസവവേദന കുറയ്ക്കുന്നനായി എപിഡ്യൂറൽ അഥവാ സ്പൈനൽ ലഭിക്കുന്നത്
മൂലം ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടസാധ്യതകൾ

അപകടസാധ്യതകൾ	ഇങ്ങനെ എത്ര പ്രാവശ്യം സംഭവിക്കാം ?	ഇത് എത്രത്തോളം സാധാരണമാണ് ?
രക്തസമ്മർദ്ദത്തിൽ പ്രബലമായ താഴ്ച	50 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	യാദൃശ്ചികം
ഇതുകൊണ്ട് പ്രസവവേദന കുറയാത്ത പക്ഷം മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങൾ വേദന കുറയ്ക്കുവാൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത്	8 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	സാധാരണം
സിസേറിയൻ ആവശ്യമായ രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തത് മൂലം ജനറൽ അനസ്തെറ്റിക്ക് നൽകേണ്ടി വരുന്നത്	ഓരോ 20 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	ചിലപ്പോൾ
ശക്തമായ തലവേദന	ഓരോ 100 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക് (എപിഡ്യൂറൽ) ഓരോ 500 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക് (സ്പൈനൽ)	അ സാധാരണം
ഞരമ്പുകൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്ന ഹാനി. (കാലുകൾക്കോ, പാദങ്ങൾക്കോ ഉണ്ടാകാവുന്ന മരവിപ്പ് അഥവാ കാലുകൾക്ക് തളർച്ച)	താൽക്കാലികം- ഓരോ 1000 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	അ പൂർവ്വം
പ്രഭാവം 6 മാസത്തിൽ കൂടുതൽ നിലനിൽക്കുന്നത്	സ്ഥിരം- ഓരോ 13000 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	അ പൂർവ്വം
എപിഡ്യൂറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ	50,000 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	വളരെ അ പൂർവ്വം
മെനിൻജൈറ്റിസ് (മസ്തിഷ്കജ്വരം)	100,000 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	വളരെ അ പൂർവ്വം
എപിഡ്യൂറലിൽ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നത്	170,000 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	വളരെ അ പൂർവ്വം
ആക്സ്മികമായ അബോധാവസ്ഥ	100,000 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	വളരെ അ പൂർവ്വം
തളർവാതം ഉൾപ്പെടെ ഗുരുതരമായ പരുക്ക്	250,000 സ്ത്രീകളിൽ ഒരാൾക്ക്	വളരെ വളരെ അ പൂർവ്വം

